

**CHOLERA
MORBUS
METODO DI
CURARE LA
MALATTIA E...**

Benedetto Trompeo, ...



CHOLERA MORBUS
METODO
DI CURARE LA MALATTIA
E
MODO
DI VIVERE PER PRESERVARSI
ESTRATTO
dal Repertorio M. "C." Piemontese
RIUNIONATO DAL DOTTOR
TROMPEO e DE-ROLANDIS

—

TORINO, 1831
PER GIOSEFFE VACCARINO LIBRAIO
IN PROPRIETÀ



Confalonieri



OSSERVAZIONI

Scrisse da memoria di carcere la malattia appellata Cholera-Morbus, compilato dal Consiglio di Medicina a Paderburgo l'anno 1814, e tradotto con note del Dottore Benedetto Trompa A. Ripetitore di Medicina, e Socio corrispondente di varie Accademie.

NOTIZIE STORICHE

Questa malattia di un genere particolare, che consista in vomiti accompagnati con diarrea, non vuole essere vista nella categoria del mazzogginismo, ma ha preso un carattere epidemico nell'anno 1817 nella India. I Macchi Inglesi, che vi si trovavano in quel tempo riflettendo aver essa dato la sua prima strage nel mese di agosto del 1817 alla distanza di cento miglia di Calcutta verso il nord-est, e nel mese di settembre dello stesso anno si propagò gradatamente sino a quella città, lasciando ovunque la terribile più fucina del diavolo, e della mortalità non pensò quindi nell'esercito acquartierato a Moudalago, e nel cantone, e nelle spazio di un anno, avvicinandosi sempre più, colpì Bombay nel settembre del 1818 nelle coste del Coromandel, facendo perire migliaia di abitanti.

Di là passò nel 1819 nell'Isola di Ceylon, e Siam e a Malacca, e quindi nelle Cinesi come pare nell'Isola di san Maurizio (altimenti detta Isola di Francia) e tre mila miglia inglesi dall'India Inferiore nel 1821 e alla seconda le relazioni de' giornali nell'Asia Minore, principalmente nell'esercito stanziato intorno a Bagdad. È molto verosimile, che secondo il suo privilegio per la Persia il Cholera-morbus, abbia colpito a poco a poco il paese di Schirvan. Il suo paese progressivo di città la città egualmente su le grandi strade fu così esultante, che al dire de' Medici inglesi abitanti nell'India si poteva chiaramente indicare le sue vestigia, e lasciare temere, che una malattia così pericolosa si introduceva ne' Generali prossimi alla frontiera della Persia. Questi stessi Medici portavano marci degli *emigré*, di cui sono stati testimoni, che secondo le sue stragi in un luogo, il morbo progressivo nelle contrade le più vicine. I venti non arrestano, nè precipitano il suo corso. Evi pare ad osservare, che del Bengel si è trova che al Decca la direzione assolutamente contraria de' venti del sud-ovest, i quali continuamente soffiano durante qualche anno.

Sebbene l'esperienza abbia dimostrato, che non si cura sempre colpito da questa malattia nel trovarsi al contatto con coloro che ne sono affetti, bisogna con tutto ciò asserire che si comunica per contatto. Nell'Isola di s. Maurizio, ora per tale malattia perirono molti abitanti, gli Europei che si marirono non furono che tre, perchè questi lasciarono le città, e presero tutte le precauzioni neces-

aria sotto una malattia epidemica. Né la stagione, né il congiungimento dell'atmosfera con l'acqua influono di sorta in questa malattia.

La esperienza frattanto ha provato, che i luoghi umidi, e che le abitazioni anguste, l'indebolimento de' corpi per cattivo lavoro, la mancanza di vesti, il cattivo cibo dispongono a questa malattia. Così nell'India gli Europei in numero assai minore degli indigeni sono presi da codesto male esposti.

Nell'esercito inglese accampamento nella India la mortalità darò quindi, sino a tanto che non si abbandonarono i luoghi bassi ed umidi per li più elevati ed i più asciutti. Si è osservato, che le terre ora crescono il riso, e le erbe che, ora dopo le inondazioni del Gange, e del Goll i terreni rimangono paludosi, e con cui i luoghi bombavano come del tutto asportati per questa malattia, quantunque per altra parte le praterie le più gradevoli, ed i luoghi elevati non ne siano inferamente esenti.

Accidenti e sintomi della malattia.

Sono i principali sintomi della malattia:

Una costenza diarrea con un vesicle acquoso, e di consistenza viscosa. Non vi è punto di bile nella materia rigettata dal vesicle, ed ecco il motivo, per cui il nome di cholera morbus, cioè diarrea biliosa, con cui si appella, non riesce troppo agguistato all'idea che rappresenta. Giusta le osservazioni di Bezzoli, si sente talvolta dagli ammalati al principio di questa malattia un senso di prurimento strordi-

aria di ferro accompagnata da dolori violenti, da indebolimento totale in tutte le estremità, diversi quelli che vengono seguiti da un terribile male di capo, e da sete sedente, ben tosto da nausea, e da vomito, granchi così forti (Compte construction del latic) da non potersi contenere l'emulsione. Talvolta la malattia comincia con diurea puramente acquosa senz' altro male, e nel medesimo tempo, od alcuni ore dopo, si rigettano certe mucosità biancastre, e cui ten dietro un indebolimento totale; il polso s' indebolisce, le membra, e la superficie del corpo divergono fredde, gli occhi si affondano e sono rivestiti con l'abiezione laetante di sangue. Scorgesi nella faccenda il più triste avvilimento, i malati si legnano di febbre ardente, e dimandano continuamente bevande agghiacciose, crescono i conati della diurea, l'agitazione e la tristezza giungono ad un punto, che l'emulsione senza interruzione si getta da una parte all'altra, si può appena trovare un momento in cui si lascia toccare il polso, il quale diviene così debole, che appena si può sentire. Allora cominciano gli spasmi, che d'ordinario si alzano dalle dita dei piedi sino al petto, ora producono perniciosa agonia. Si è osservato qualche caso, sibben di rado, in cui la malattia ha cominciato da spasmi (compte), e che sono stati conseguiti da diurea. Nell'isola di Ceylon Davy ha osservato, che il sangue nella vena era nero, e che l'aria, che i malati espirano, conteneva tre volte meno di gas acido carbonico, di quello che ve ne ha nell'aria ispirata da persone sane.

Faustin ha detto che nel Ceylon qualche persona è morta senza granché, e senz'altre sintomi distintivi, fuorché di quelli indicati di sopra.

Egli ha pure osservato, che fra i quadrupedi che accompagnavano l'uccello, molti morirono senza alcuna causa palese, ed in un modo del tutto incomprendibile ¹.

Non vi è persona che speranza almeno di salvare il malato quando la superficie del corpo diventa fredda, e quando il freddo si fa specialmente sentire alla regione precordiale, che la lingua agghiaccia, e nel tempo stesso la pelle della palma della mano, e della pianta dei piedi si aggrissa. Ordinariamente è minore che cotesti sintomi si fanno più intensi e che gli spunti, ed i deliri diminuiscono, e prima dei momenti estremi scompaiono del tutto; e subisce la pulsazione del cuore sia così debole, che appena si può sentire, il malato tremola allora molto sofferto. Ciò non ostante Corbin ha veduto talora soffrire nelle piazze più orribili sino agli ultimi momenti, gettarle tante grida e gemiti, avvolgendosi per terra sopra tutto se la malattia si protrarre al di là del terzo giorno; se al contrario non vi erano ancora spunti, quando col vomito, e colla

¹ Il è pure osservato che la sigpatis non sparisce talora il sangue de' malati molto del cholera, in P. *«Giornale»* *«Messager des Indes»*, etc.

Per un bel pezzo al tempo ha dovuto tradurre in questa maniera, *«Però però che i complicati della cholera abbiano talora talora una qualche quantità d'una materia più l'essenza della materia come generale non che negli animali producono il cholera senza che la cholera non si appaia la grande forma della cholera»*.

diarrea si rendono un poco di bile, e non materia acquosa, quando la superficie del corpo non si raffredda, allora si poter sperare la guarigione dell'ammalato.

Curazioni dopo la Necropsia.

Se la malattia ha durata più di 24 ore, allora nell'incisione del corpo si osserva, che il ventricolo, e gl'intestini sono del tutto distesi dall'aria, e da mucosità dense. Non vi è bile negli intestini tenui, nè nello stomaco. Le vene del fegato, e qualche volta quelle degli intestini inferiori (bei) sono ingrossate, la vascioletta del fiele repleta di bile nera, i muscoli divergono simili a quelli degli apoplectici, ed i polmoni si restringono.

Cura praticata nelle Indie dal Medico Inglese.

Questa malattia terribile, che non si prolunga al di là de' tre giorni, che alla volte fa morire nella spazio d'un sol giorno, non si guarisce mai da se stessa, ma richiede la cura la più pronta, e la più efficace.

Il Marchese di Hastings ha fatto sorgere a provisione nell'esercito dell'Indie la deposizione del metodo di cura praticato dal Dott. Cochis, la quale dopo la prova fu trovata pienamente efficace.

Quando Medico prescrive al malato 20 grani di mercurio dulcis (calomelano) da prendersi in pillole, e non in pillola, bevendovi sopra una porzione

composta di 60 picciole di laudano, un granaio di olio di menta pipenta: il tutto sciolto in due once di acqua. Al principio della malattia si deve ricorrere al salasso; quindi alla friggitura con gli spiriti rissolati, si bagni caldi, si coprirà il corpo con panni caldi, e si adopreranno degli eccitanti (cardiaci).

L' uso del mercurio dolce, e dell' oppio si rinnova dopo un' ora di tempo almeno secondo il bisogno; riguardo alla quantità che se ne deve usare, varia di grado della necessità. Alcuni Medici Inglesi posero a somministrazione copiosa dosi di mercurio, finchè una affezione da questa malattia trascinò per insensibilissima tutta in una volta la dose destinata per più volte, ed in seguito la 60 picciole di laudano, e restò a questa mole guarita.

La speranza però in seguito l' effetto salutare di queste grandi dosi. Quando il Medico è chiamato troppo tardi secondo metodo, che questi stessi rimedj sono rigettati pel vomito. In simile caso Wallase mischiò due grani di oppio, e 15 grani di mercurio dolce con due once (sulotrika) di miele, e con questa mistura strapicchiando leggermente l' interno della bocca, il malato inghiottiva a poco a poco questo rimedio, e si addormenta. La tosse compare dagli accidenti, e del vomito rubando un rinverimento di rimedj. Nell' modo di s. Maurizio si è impiegato questo rimedio in minor quantità, ma con minor successo.

I medici Francesi impiegavano invece il sale amaro alla dose di due dramme: risulta però dalle

lare relazioni che fra 440 scendano 34 scendano. Telen, ed Assier consigliano di applicar nel ventre dei rubefacienti. Ma siccome la costipelli aggrava lentamente, ed propugnono di punire con penna intrappata nell'acqua-forte alle scabiecole del cuore; e dicesi l'acqua-forte ha bastantemente agito si lava la piaga con acqua o con potassa dissolta.

Milnesord comincia col somministrare un lotto d'aceto di mercurio dolce (colomelano) con 5 gradi di polvere di acetato (jonus pendere), due ore dopo somministra dieci gradi di mercurio dolce, e 5 gradi della polvere sopra indicata, ed unisce alla bevanda lo spirito di vitro dolce. Quando il vomito scema e la pelle diventa calda, ed umida, allora impiega come purgante la magenta ordinaria, di cui dà quattro scrupoli in ogni dose, che, secondo me, non produce vomito, e non purga che due o tre volte.

Questo Medico attribuisce degli effetti salutiferi al salini fatto a tempo. Di 38 malati curati secondo le sue prescrizioni con un solo periodo che 8. Ma ancora non era ingratissima giunta le sue asserzioni della vanità lucra, e motivo del restringersi convulsivi.

Tector consiglia l'infuso dell'infusione d'oppio puro, assicurando che l'infusione invece di attenuar il vomito, lo aumenta qualche volta, ed è per questo che Bayle si serve unicamente dell'infusione nel artificiale, contro di questa malattia. In generale il mercurio dolce, e l'oppio furono tenuti dai Medici Inglesi che si trovavano nell'India nel tempo di que-

sta ultima epidemia come i mezzi più efficaci; gli altri rimedi] deggiono essere presi come modificati, o sia come accessori].

CONCLUSIONE.

Nonchè il nostro paese non è mai stato soggetto a tale malattia terribile, il Consiglio de' Medici non può presentarci altri mezzi che quegli impiegati dai Medici Inglesi nell'Indie: mezzi di già menzionati nella nostra storia di sopra citata.

Il Consiglio dei Medici avendo pertanto basate le sue opinioni sopra questi luoghi, crede che il corso rapida di questa malattia terribile esiga altrettanto precauzioni, e preservativi al pari delle altre malattie le più contagiose. Dunque

1.^a Bisogna evitare ogni comunicazione con i luoghi, ove questa malattia si è manifestata, essendo non minore sanitaria indispensabile. Lo stabilimento delle quarantene dietro la regola ordinaria dipenderà dalla potenza del luogo.

2.^a Bisogna schivare per quanto è possibile il viaggiare, ed appiarsi in luoghi asciutti, bassi, ed umidi; non da essersi nell'appartamenti delle truppe.

3.^a Separare in seguito i malati dai sani.

4.^a Non usare se non cibi freschi, e salubri, nè qualunque frutta in abbondanza, particolarmente questo non meno del tutto maturo, ed avere attenzione alla qualità del riso.

5.^a Vestire caldamente, particolarmente quando il tempo è freddo.

6.^a Raccomandare vivamente alle podestà militari e civili di chiamare il Medico al principio della malattia, poichè più facilmente la si può arrestare se i soccorsi sono prontamente amministrati.

7.^a Il Consiglio de' Medici raccomanda a ciascun Medico impiegato nel curare questa malattia le norme seguenti, praticate con felice successo dai Medici inglesi nell'India. Continua sopra di tutto salutare il malato senza dilazione: si giudicherà della quantità del sangue ad estrarre dalla costruzione del paziente, ma in ogni caso non se ne deve estrarre meno di una libbra.

8. In seguito bisogna dare 10, o 12 grani di camomilla ridotta in polvere con zucchero e gomma arabica.

9. Dare indi 40, o 60 grani di tinct. d'oppio, e di valeriana, di lactica liquida (*Syrdeham*) e un goccio d'olio di menta, di melissa, ed anche d'acqua semplice.

10. Bisogna strapigiare con una penna istiva nell'occupar la cute alla regione del cuore due o che la pelle divenga rossa; allora si bagna il luogo con acqua, e potersi dischiare. Si può ancora impigiare per lo strofinamento dello spirito di sale ammoniac, o dell'unguento ordinario di mercurio; si possono pure applicare nel venire della venaia.

11. Si strofini tutto il corpo con acquavita calda, e quello che è meglio ancora con lo spirito di camfora, e di sapone.

12. Se è possibile avere un tipo bisogna far prendere all'ammalato un bagno, il cui calore dee salire

ai 3a gradi del termometro di Reaumur. Non sarebbe male porre della potassa nel bagno, e delle erbe aromatiche: e non potendosi avere il filo si può lavare e bagnare il corpo con acqua calda.

13. Dopo il bagno, ed anche prima, si ricopre il corpo con panni e vesti calde.

14. Se i rimedj somministrati internamente sono stati rigettati dal vomito, allora bisogna prendere un'altra dose eguale alla prima (si concetti il numero 8 e 9). Se è rigettata prima di avere operato qualche effetto, bisogna dare una specie di seguitino, in cui si pongano dieci gradi di mercurio dolce e due gradi d'oppio, e due uncie (scandinave) di aceto e bisogna coprirne debolmente la lingua, cioè a che sia tutta trasognata.

15. Si può diminuire il tenace, e gli spasmi negli intestini coll'uso di un clistere di liquori medicamentosi con 5o e più grane d'infusione d'oppio.

16. Una ripetizione di medicamento non 8 e 9, e la quantità che bisogna darne, dipendono dalle circostanze, cioè che bisogna raccomandare all'attenzione del Medico. Nel rimanente piccola dose di rimedj non possono produrre alcun effetto in quarta malattia.

Forse tanto la quantità indicata dai Medici Inglesi non può servir di legge, quando i malati, e gli accidenti appartengono di nuovo, allora bisogna ripetere i mezzi di guarigione. In ogni caso non, cioè, o tre ore dopo che si è presa la prima dose, si deve dare del mercurio dolce, ma un po' meno e continuare sino alla total cessazione del vomito.

17. Se nella cinque o sei ore dopo la prima dose della medicina il vomito è totalmente cessato, è necessario qualche volta spurgare il tubo intestinale mediante la semplice ingiunzione, ed un'oncia d'olio di ricino, e non intervenendo di contraindicazione l'ordinario con infusione di rebarbora e gomma arabica disciolta.

18. In generale bisogna essere persuasi che la guarigione dipende dall'abilità del Medico e dalla sua attenzione scrupolosa.

Dopo la raccolta di Medici sperimentati si sa che fino a tanto che l'ammalato non ha avuto ancora degli spunti l'effetto della medicina è molto più sicuro. Bisogna adunque prescrivere ai Medici militari e civili di curare, fino dal principio di questa malattia i più pronti soccorsi.

19. Oltre a questi mezzi si può ancora tentare di ammorbidire internamente una dramma d'acido marino sciolto in un liquido dilungato mulligioso. Il suo effetto antilogico è secondato, e si potrebbe sperare ancora che sarebbe utile mischiandolo con oppio.

20. Bisogna rammentare che oltre ai mezzi indicati succede talvolta che bisogna particolarmente, cessando il vomito, impiegare acidi virifonanti, di cui si lascia la scelta ai Medici che curano i malati colpiti da questo flagello.

Ritorna a desiderarsi che essi progano tutta la loro attenzione nell'osservare con l'andamento, ed i progressi di questa terribile malattia, come gli effetti prodotti dai medicamenti, e che poter giungere ad avere una cognizione perfetta.

Situazione avanzata del Governo austriaco onde prevenire i suoi scopi della invasion del Cholera-morbus, e impedire la propagazione.

1. Sappiamo l'indole contagiosa del cholera asiatico orientale non essersi peranco ascientemente dimostrata, e che da da diversi Medici inglesi del tutto saggi, esistono alcune buone prove non numerose a favore del carattere o capacità contagiosa di questa malattia, che non può essersi in dubbio la possibilità della sua comunicazione.

2. Quindi la prudenza, ed il filantropico sentimento di ogni stato incivilito ingiungono di non trascurare alcun mezzo idoneo a por argine all'ulteriore propagazione di sì terribile flagello.

3. Dovrasi anizitutto contro di esso tutte quelle misure prescritte dalla polizia sanitaria. A tale scopo, pensando che il cholera è limitato nelle remote provincie della Russia, conviene nei luoghi ove esistono cordoni sanitari, procedere a norma del secondo grado delle misure pestilenziali contro tutti gli oggetti provenienti da quella contrada sospetta, lo stesso si praticherà nel litorale per la prevenzione dei porti reali. Avvicinandosi il pericolo si insiglierà ancora con maggiore umiltà, osservando ben bene ogni qualunque malattia che possa dartura qualche dubbio, la corrispondenza colla Russia si sottoporremo alle discipline rigenti intorno alla lettura quindi dei paesi notoriamente affetti da peste.

4. Si avrà dunque piena cognizione della comparsa della malattia, ed che è altrettanto indispen-

abile pel motivo che lavori d'ordinario speranza di guarigione se si cura presto secondo agli infermi di *cholera morbus*; a tale fine si pubblicheranno i principali sintomi e caratteri con cui vuole manifestarsi il *cholera*, ed esclusione d'ignoranza nel vulgo.

6. I sintomi prodromi sono: debolezza, tremore ed abbassamento delle membra, dolore al capo, vertigini, nausea, privazione di appetito, ingonfiamento, affanno, veglie, palpitatione, oppressione alla circolazione del cuore, alternanza di freddo e caldo, con sudori gelati. Subito dopo, brividi gelati nel ventre, vomito, nausea, stringimento alle fauci, sensazione di sete, e pienezza di stomaco.

7. Presto poi sviluppi il *cholera*, dopo varie complete morbie altrui, con perdita di fluidi acquosissimi, bruciore all'ano, vomito di fluidi mucosi, per lo più bianchi e senza acqua, bianchicci, misti a materia glutinoso-globosa. Non si vede bile, o ben poco, il respiro si aggrava, con affanno e stringimento di cuore e con frequenti ed interrotti parossismi. Alternano nel basso ventre i dolori ed il bruciore, cresce il tenesmo e la vomiturizione, le urine scarseggiano o si sopprimono. Sono inestinguibili, viva *dilatata d'oreis* fredda, seta insopportabile nelle fauci e nell'esofago; inquietudine continua, bocca secca, *Tegua* fredda, bianca, *halitus* fetido, *arteria* fredda, da polsi a manifestano dolori acuti, poi succedono convulsioni e spasmi fortissimi, particolarmente alle dita delle mani e dei piedi, ed alle cosce delle gambe che si esten-

sono perduti al ventre, ai lombi, ed alla parte inferiore del torace. Debole si fa il polso, e talvolta appena percettibile, occhi rossi, sguardi immobili, inarcati nella orbita, e circondati da fluida sierosa; volto amaro, ed una debolissima e quasi assente emozione l'innervante agonia; il corpo stretto e per lo più duro e nudo.

8. Il corso del cholera epidemico è così rapido, che la sorte dell'infermo decideasi nelle prime ore; molti soccombono in 7, 10, un ora, ben di rado il male percorre più di due giorni, ed allora si notano spaziosi di gastriglossa, la quale succede prontamente.

9. Quando il brivido della superficie del corpo progredisce sino alla rigidità, nascono sudori freddi, la testa si fa rovente; cessano i dolori, ed i tratti quomodocumque indicano ad uno stato di paralisi, e quando si segui di apparente miglioramento succede l'abolizione del sensi e della coscienza, e si presentano qua e là lividi macchie sul viso, allora la morte è imminente. Se prima delle gravi convulsioni si evacuano per bocca o per ano materia biliosa, acquosa e fluida, e se non si accresce il freddo della manbra, è ancora sperabile la gastriglossa.

10. e 11. Verificandosi in qualche località limitata, un caso che presenti i sintomi sopra descritti anche in parte, si chiamerà un Medico, e se ne farà immediato rapporto all'autorità; ogni negligenza deve severamente redarguirsi e punirsi. Si separeranno gli infermi a termine dalle prescrizioni vigenti in

tempo di peste; con tutto rigore si stabilirà la coesistenza, ripartendosi alle profilattiche minime già note in occasione di peste, in quali si seguiranno nelle massime loro estensioni.

12. Le precipue circostanze che facilitano lo sviluppo del cholera sono: un'aria umida, le condizioni contratte massimamente di notte, un albergo umido e chiuso, l'eccessiva appiessione di corpo e di mente, i cibi pesanti, l'intemperanza, l'abbuttimento d'anima, mancanza di abiti, e tutte ciò che affacilita le forze. Sarebbe pure svilupparsi più facilmente nei luoghi paludosi, soggetti ad inondazioni. L'ordine sarà dovere delle autorità e dei Medici di porre in opera quanto è necessario per togliere o stemperare l'influenza delle mentioned cause.

13 e 14. Per rinvenire delle persone affette dal cholera, si preferiranno gli edifici collocati in elevazione ed ariati; non devono troppo essere repleti di pazienti, affinché le medicine antichità non aggraveranno il male. Si userà la migliore pulizia nella infermeria, con incubi ad aria pura e ventilata. Nell'interno la temperatura sarà circa al gr. 15 di R.; e si preferiranno due volte al giorno profumi con aceto, e meglio con cloro: al quel tempo si adopera il metodo di Guyton Morveau; e si agiterà la camera con una soluzione di cloro di calce nella proporzione di un'uncia di cloro per ogni libbra. Viennese di acqua; lo sviluppo del gas cloro non si applica al grado di essere al nascente.

17. Si raccomanderà agli abitanti fra cui scoppia il cholera di andarsi con abiti caldi e farli a di-

gerirsi; non è male l'uso moderato del pepe, del peperoni, del coriando, degli anisi, dell'aglio, della cipolla e simili. Basta alle frutta crude, aspre, acquose, immature, affate; si mangiati, alla segale, si bevinoli. Del pane si preferiranno la biada, l'idraulico, il latte insalato, il pane, il farinello (sempre cotto con rape), i fanghi, i pasti caldi e cotti, la vivanda gustata. L'uso di porri acquosti e liquore è escluso, come pure il bere nel giorno un bicchiere di vino; persino l'abuso delle bevande spiritose e dei cibi calafaccianti aromatici, oggì replezione di stomaco nessuno alla sera è al sonno molle; l'ubbricchatura è proibita, si sorvegliano quindi le bettole e le taverne in proposito.

18. Si vestiranno anzitutto, e si profumeranno non tanto, e meglio col cloro tutte le cose di quei paesi ove si fosse manifestato il cholera; gli abitanti non andranno mai a digiuno, ed in liquore si mantengono qualche cosa di spiritoso o rinfreddante, p. e. tè di cannella, di menta ecc. Eviteranno ogni fatica irregolare, i viaggi sfrenati, il vagabondaggio e la gazzuaglia. Si vestiranno sufficientemente bene, non dormiranno all'aria aperta singolarmente alla notte, non partiranno di presto dopo il sonno senza averli bene coperti; manterranno una media traspirazione, per cui s'indovnerà sulla pelle un abito di lanella, ricorrendo l'addosso con una fascia di panno; con buone scarpe si difenderanno le estremità dall'umido, e si inteneriranno frangendo sopra tutto il corpo mattina e sera con pezzi di lana calda e con sarte tepide.

19. Giareck anche riducente la bevanda infernale dei parenti per ritogliere negli abitanti la fiducia nella divina Provvidenza, tranquillare e fortificare il loro animo.

20 e 21. I Medici, Chirurghi, Curati ed infermieri non impendano mai il loro ufficio a stomaco vuoto, e senza avere prima preso qualche bevanda spiritosa. Si eviti possibilmente d'inghiottire l'aria circostante all'inferno, e quella da lui aspirata; si lavorino le mani con aceto, portandosi seco una bottiglietta d'idro-clorato di calce, ovvero di aceto forte aromatizzato, il che servirà per ungere le mani insudate frequentemente; si sciocquino la bocca con aceto allungato, e con acque di Colonia e simili; terminata la visita si profumino i vestiti e si rinfreschino. La autopsia anatomica richiedano la massima accuratezza, e prima i cadaveri nei visceri aperti devono aprirsi nel cloruro di calce; i bacilli enterici pare il contatto immediato coi cadaveri.

22. Si applicheranno inoltre tutte le misure prescritte per l'estirpazione del contagio della peste, e che si riferiscono all'espurgo e distruggimento degli effetti infetti e molto sospetti, ed al trattamento delle persone ed abitazioni sospettate.

23 e 24. Venendo chiamato un Medico al principio della malattia, cioè prima che s'approssimino le rivelazioni ed il stadio delle morbi; farei intanto una sanguigna che ordinariamente si è rimasta effluvia. Negli adulti anche di 12 e 15 once; in all'apertura il sangue scolorito ed agio, scolorito an-

fiore e coprire la superficie di del corpo che delle membra con panni caldi, indi proseguire la depurazione sanguigna; si farà anche uso di un bagno caldo da 30 gr. di R. ovale vieppiù attivare la circolazione. La stagione, il clima, il carattere epidemico, il temperamento ecc. devono servire di norma per la quantità di sangue da lavarsi, dovendosi avere s'insi di mira il sollievo che ne ritrae l'ammalato durante l'attitudine angriosa.

25. Esigete il calano, e qualora esso non fosse più applicabile per essere di già giunti i deboli di sangue, gli spazii ed il freddo della membra, nel qual caso sarebbe perfino dannoso, si passa tosto all'uso del proto-cloruro di mercurio, e degli opjati, i quali due specifici debbano, giusta le esperienze finora intrise, considerarsi per i più utili contro il cholera epidemico; ma la speranza del felice risanamento è riposta soltanto nelle dosi abbondanti.

26. dico al 25. Quindi si porgeranno 10, 15 once a 30 gradi di proto-cloruro di mercurio, con poco zucchero e gomma arabica sotto forma di polvere, e man' ora dopo 40 once a 50 gradi di lactase liquido del Sydenham: questa dose si ripeterà due o tre ore a norma del bisogno, e si continuerà così a che i sintomi principali, in specie il vomito, la sudorazione alina, il bruciore ed ardore addominale, e le spasmodiche contrattioni non siano cessati, nel qual caso la dose sarà ridotta alla metà. Contemporaneamente si faranno friggajoli sulle membra raffreddate, ed in stato di spasmodica contrazione,

e mantiene alla regione del cuore e dello stomaco, esso si aggraverà con angustie, nello spirito agitato e confuso, e con emorragie liquide diffuse, procurando d'involgere l'infirmità in pezzi caldi; quanto più forte divengono le convulsioni ed il freddo delle estremità, e quanto più si esasperano le debolezze e spossanze, tanto più si replicheranno le frizioni, le quali si corroboreranno col reciproco validi sotto le piante e sulla regione del ventricolo, anche in pari tempo qualche acqua eccitante, staccatamente profondole nei movimenti rimedi, ed alcune gocce di olio di menta purpurea nello zucchero. Se l'infirmità rimanda i rimedi somministrati, il che occorre ogni volta che il Medico è troppo tardi richiesto, si ripeteranno le due infusioni, ma altrettanto frequenti, e non potendo le stomaci resistere, si spalmerà la lingua e la superficie del palato con un elettuario fatto col miscuglio di 3 grani di oppio, 15 grani di proto-diocrato di mercurio, e 3, e 4 dracme di miele, onde l'infirmità col deglutire lentamente ed insensibilmente la saliva, senza per tanto la prescritta medicina. Onde scemare il corso delle defezioni ed i dolori convulsivi del basso ventre, si fanno clisteri emollienti, con un po' di oppio, cioè 3 o 4 once di bollente anthem. di riso, di orzo, di radici di asclep., e di sili, o di semi di lino pesto con un o due grani di ludano liquido, ripetendoli ogni due o tre ore. La rete effluvia si calcherà col decotto di orzo o di riso, con una infusione di fiori di camomilla amministrata tepida, ed in piccole

ritirate del. Se nelle spazio di cinque o sei ore non arrivano i vomiti nè diarree emetiche, e che eccitino gli spasmi, e la superficie rischiarandosi rosacea e tingitura, e l'infirmità merò lo sordinamento ed il riposo, annuncia l'effetto del vomito di papavero, oppure dietro pilulano indica l'azione del mercurio dolce, e dietro biliosa poltacea apertiva, allora dovrà strettamente desistere da questi farmaci, ed in luogo loro somministrare una leggera mistura corroborante carnativa, come l'acqua di melissa, di menta con un poco de liquore scordio dell'Hoffmann, ed un poco di gomma di olio di menta pipavita sopra un pezzetto di zucchero: per terminare la cura giva un po' di tintura di rebarbaro, con acqua aromatica e gomma arabica. Quando il vomito si ritira l'infirmità colle anppe sostanziose, con gelatine di riso e di orzo spuntate, ed anche di quando in quando con un cordoglio di vino generoso. Accendendo strettamente pendente la convalescenza, si farà uso di un'ozia di olio di ricino, e d'una dramma di sub-carbonato di magnesia con 10, e 15 grani di rebarbaro polverizzato. Si avrà molta cautela nel sollazare all'appetito.

35. Tutte le diurne saranno provvedute in sufficiente copia e delle migliore qualità di tutti i rimedii da qui necessitati.

36 e 37. Si riserva il Governo di far pubblicare tutto ciò che concerne alla misura da prendersi in caso d'irruzione del cholera; ed uno poi del personale incaricato la Medicina si aggiunga un'attenzione dispartizione intorno al cholera-morbus, quale scien-

24

alle ampliazioni, e contemporanee espresse delle
induzioni casualmente esperte nella presente istru-
zione.

Venezia, 18 novembre 1811.

